

NOTE SUR LES FLACOURTIACÉES DES MASCAREIGNES

H. SLEUMER

SLEUMER, H. — 18.03.1980. Note sur les Flacourtiacées des Mascareignes, *Adansonia*, ser. 2, 19 (4) : 495-496. Paris. ISSN 0001-804X.

RÉSUMÉ : Établissement du nom de l'espèce-type du genre *Erythrospermum* Lam. ainsi que de trois nouvelles combinaisons dans ce genre.

ABSTRACT: Establishment of the name of the type species of *Erythrospermum* Lam. and of three new combinations in the genus.

H. Sleumer, *Rijksherbarium, Leiden, Netherlands.*

Le genre *Erythrospermum* Lam., dans la région malgache, n'existe qu'à l'île Maurice. Certaines étiquettes erronées ont pu faire croire qu'il se trouvait aussi à Madagascar, mais, jusqu'à preuve du contraire, aucune récolte n'a été faite de façon certaine dans cette île.

LAMARCK établit son genre *Erythrospermum* in Tabl. Encycl. Méthod. Bot. 2 : tab. 274 (1792), mais sans donner de nom aux deux espèces qu'il figurait. Ce fut DU PETIT-THOUARS qui le premier les nomma en 1806.

Les auteurs anciens distinguaient plusieurs espèces à Maurice, mais déjà BAKER, in *Flora of Mauritius and the Seychelles* : 10-11 (1877), ne retenait qu'une seule espèce avec un certain nombre de variétés. Nous sommes également de cet avis, mais BAKER donnait à l'espèce un nom illégitime. Le nom que nous retenons est :

Erythrospermum monticolum Thouars

Hist. Vég. Isles Austr. Afr. : 67 (1806), *err. monticola*.

— *E. verticillatum* LAM. ex POIRET, Encycl. Suppl. 2 : 585 (1812).

Espèce-type du genre, caractérisée par des feuilles subopposées ou subverticillées au sommet des rameaux et des grappes courtes, subombelliformes.

TYPE : *Thouars s.n., s. loc. (holo-, P)*.

Les variétés sont les suivantes :

var. *cordifolium* (Clos) Sleumer, *comb. nov.*

— *E. amplexicaule* DC. var. *cordifolium* CLOS, Ann. Sci. Nat., ser. 4, 8 : 257 (1857).

Caractérisée par des feuilles grandes, atteignant 18-20 cm de longueur, à limbe largement arrondi et cordé à la base et à pétiole subnul ou très court.

TYPE : *Bojer s.n.*, Madagascar? (sans doute de l'île Maurice) (holo-, P.)

var. amplifolium (Thouars) Sleumer, *stat. nov.*

— *E. amplifolium* THOUARS, Hist. Vég. Isles Austr. Afr. : 67, tab. 21, fig. 2 (1806).

Caractérisée aussi par de grandes feuilles atteignant 20 cm de longueur, mais à limbe cunéiforme ou faiblement arrondi à la base et à pétiole long de 0,4-1,5 cm.

TYPE : *Thouars s.n.*, *s. loc.* (holo-, P.)

var. pyriformium (Lam. ex Poiret) Sleumer, *stat. nov.*

— *E. pyriformium* LAM. ex POIRET, *Encyl. Suppl.* 2 : 586 (1812).

— *E. mauritianum* BAKER *var. pyriformium* (LAM. ex POIRET) BAKER, *Fl. Maur. and Seych.* : 11 (1877), *nom. illeg.*

Caractérisée par des feuilles plus petites, ne dépassant pas 10-14 cm de longueur, ressemblant en cela à la variété typique, mais le plus souvent alternes au sommet des rameaux et non subverticillées.

TYPE : *Stadman 36*, île Maurice, Bois de Brèdes (holo-, P.)